

---

---

DISPUTATIO MEDICA

PRO GRADU DOCTORUM  
INAUGURALIS,

AD  
DE

ICTERICO.

---

---



DISPUTATIO MEDICA INAUGURALIS,

DE

I C T E R O ;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi Admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, S. S. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON

Amplissimi SENATUS ACADEMICI Consensu,

Et Nobilissimæ FACULTATIS MEDICÆ Decreto;

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS ;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

JONAS ASPLIN, A. M.

ANGLO-BRITANNUS,

SOCIET. REG. PHYSIC. EDIN.

SOC. HON.

SOCIET. CHIRURGO-PHYSIC. EDIN.

SOC. EXTRAORD. ET PRÆS. ANN.

NECNON

SOCIET. AMERIC. PHYSIC. EDIN.

SOC. EXTRAORD.

AD DIEM 12 SEPTEMBERIS, HORA LOCOQUE SOLITIS.

---

---

*“ Regius est vero signatus nomini morbus,*

*“ Molliter hic quoniam celsa curatur in aula.”*

Q. SERENUS.

---

---

EDINBURGI:

CUM PRIVILEGIO,

APUD ROBERTUM ALLAN,

---

MDCCXCVII.

733053

VIRO ERUDITISSIMO CELEBRISSIMO  
C. F. R. O.

ALEXANDRO MONRO, M. D.

REI ANATOMICÆ

U. GEORGE B. H. & S. S. B.

IN

ACADEMIA EDINBURGENSI

PROFESSORI

ANATOMICORUM



SCYMA OBSERVANTIA

D. D. COLE

JONAS ASPLIN

WELLINGTON N. Z.

VIRO ERUDITISSIMO CELEBERRIMOQUE,

ALEXANDRO MONRO, M. D.

REI ANATOMICÆ

IN

ACADEMIA EDINBURGENA

PROFESSORI,

ANATOMICORUM

PRIMO,

HANC DISPUTATIONEM

SUMMA OBSERVANTIA

D. D. CQUE

JONAS ASPLIN.



Digitized by the Internet Archive  
in 2020 with funding from  
Wellcome Library

NECNON

PATRI OPTIMO,

FRANCISCO ASPLIN,

ARMIGERO,

HAS

STUDIORUM

PRIMITIAS,

PIETATE,

QUA FILIUM DECET,

MOTUS,

SACRAS

VULT

JONAS ASPLIN.

---

PARTI PRIMO  
DISPUTATIO MEDICA  
FRANCISCO ASPLIN  
IN AUCTORIALI  
ARMIGER.

CORRIGENDUM.

§ xxxi. lin. 2. *pro muscuosâ lege musculosâ*

PRIMITIA

---

PRIMITIA

---

PRIMITIA

PRIMITIA

PRIMITIA

UT  
dicitur  
quodam  
scriptis



---

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS,

DE

I C T E R O.

---

JONA ASPLIN, AUCTORE.

---

PROŒMIUM.

§ I. **U**T mos est omnibus, qui summos medicinae honores ab hac academia petunt, de re quadam ad artem medendi pertinente aliquid scribere; ita, de *ictero* agere, nobis in animo est.

II. *NOMEN*.—Hic morbus, velut plerique eorum, quibus, ubique gentium et omni ætate, hominum genus sæpenumero et graviter afficitur, variis nominibus, prout cuique libuerit medicorum, qui eum tractârunt, insignitus est.

III.—I. A CELSO \*, et PLINIO SECUNDO † quoque, morbus, de quo disputare nobis in animo est, modò *REGIUS*, modò *ARQUATUS* seu *ARCUATUS* appellatur. Illud ei nomen ab his auctõribus, et itidem ab HORATIO ‡, inditum est, ideo fortasse quòd eo affecti sanentur, ut olim saltem nonnulli perperam existimârunt, si regiis deliciis impensè oblectentur || ; imprimis si utantur “ lecto etiam, et conclavi cultiore, usu, “ loco,

\* Vide AUREL. CORNEL. CELS. *De Medicin.* Lib. III. cap. XXIV.

† Vide C. PLIN. SECUND. *hist. nat.* Lib. XXII. cap. XXIV.

‡ Vide QUINT. HORAT. FLACC. *De Art. Poet.* lin. 453.

|| Vide *ibid.* in usum Seren. DELPHIN.

“ loco, ludis, lascivia, aliis, per quæ mens exhibetur; ob quæ,” ait CELSUS, “ *REGIUM* MORBUS dictus videtur \*.” *ARQUATUS* vel *ARCUATUS* nominatus est ex iudis, sive arcus pluvii similitudine, quippe quia corpus colore varium reddit †.

2. *ICTERUS* quoque vocatus est, ex ave, cui, ex colore flavo ei proprio, nomini itidem *ICTERUS* est, seu *GALGULUS*; et quæ, si ab aliquo hoc morbo laborante spectetur, ipsa mori, morbus autem sanari, traditur ‡.

3. Quinetiam, *AURIGO* a SCRIBONIO LARGO, cadentis utique Latinitatis auctore, appellatus est, ex aureo, procul dubio, colore, quo summum eorum corpus, qui eo tentantur, ubique,

A 2

præ

\* Vide AUP. CORN. CELS. *De Medicin.* Lib. III. cap. XXIV.

† Vide SWIFTEN. *Comment. in BOERHAV. Aphor.* Tom. III. p. 95.

‡ Vide C. PLIN. SECUND. *Hist. Nat.* Lib. XXX. cap. 27

præ cæteris tamen partibus, oculi et unguës, inficitur.

4. Eandem ob (III. 3.) causam, huic morbo conjugata nomina, *JAUNISSE* a *GALLIS*, a *BRITANNIS* *JAUNDICE*, indita sunt.

IV. *ÆTAS*.—I. Ullo vitæ tempore, corpus *ictero* languescere potest. Eo sæpe flavescunt proveci ætate, et senes; neque profectò rarò aut ipso confecti intereunt, aut superveniente hydrope inundati et tumidi extinguuntur.

2. Quinetiam, qui mediam aut virilem ætatem agunt, et qui, multos per annos, viribus forsàn integris gavisi sunt, ii hoc morbo interdum corripuntur; et vel graviter conflictati tolluntur e medio, vel saltem ægerrimè, et post magnum hinc detrimentum captum, superstites evadunt.

3. Imò

3. Imò, juvenes robustos quidem, neque ventri, neque potationi, neque peni deditos, *icterus* nonnunquam invadit; et non solùm pulchram formæ dignitatem deturpat, sed etiam vires, quibus, præ ætate, freti superbiunt, præmaturè labefaciat.

4. Atque adeò, insontes infantes recens nati nonnunquam *ictero* priùs plectuntur, quàm voluptatem primoribus gustaverunt labris; atque matres, timore mœroreque impletæ, sobolem flavescentem, lachrymis abortis, contuentur.

V. *SEXUS*.—Et mares et fœminæ morbo regio interdum afficiuntur. Tenera haud rarò virgo labellis suaviloqua roseis, roseo spectabilis ore, flavescit. Heu! hebescunt nunc illi oculi, haud ita pridem nitentes, aspici lubrici, quorum scintillatio conversos fervidorum juvenum oculos perstringere solebat: imò, decolorantur illæ genæ.

næ, quæ nuper rubore decoræ, puniceas rosas mane roratas æmulabantur : atque infelix virgo, quoties se in speculo vidit alteram, dicit heu !

“ Quo fugit VENUS ? heu ! quove color decens ?

“ Quo motus ? quid habes illius, illius,

“ Quæ spirabat amores ?”

HOR.

VI. *REGIO.*—Nulla, quantum scio, orbis terrarum regio est, in qua homines *ictero* non interdum flavescant. Verùm in calidis tamen et æstuosis, præ temperatioribus, hoc forsitan morbo homines sæpius decolorantur ; quippe cùm illic et hepar, quo bilis secernitur, et ductus, quibus hæc in summum intestinum devehitur secreta, sæpius malè se habeant.

VII. *RATIO VIVENDI.*—*Ictero* in primis opportuni sunt ii, qui vitam desidiosam, sine salutari corporis exercitatione, agunt : neque eodem ii rarò flavescent, qui, sibi nimis indulgen-

do vino meraciore, corpora accendunt \*. In literas itidem intenti, qui concubiâ nocte solent chartis impalescere, eodem haud rarò decolorantur.

VIII. *SPECIES*.—Quod ad colorem, quo inquinatur cutis, attinet, *icterus* in complures species dividitur: quarum præcipuæ sunt, *ICTERUS FLAVUS*; *ALBUS*; *VIRIDIS*, et *NIGER* †. De harum verò specierum primâ tantùm, disserere nobis in animo est; eòque magis, quòd cæteræ, si rectè *icteri* species dicantur, esse secundariæ seu *symptomaticæ* videntur.

IX. His (II.—VIII.) expositis, dicendum est, quibus signis definiatur *icterus*, et ex quibus causis hæc fiant.

DEFI-

\* Vide MEAD. *Monit. et Præcept.* edit. a CLIFTON. WINTRINGHAM. Tom. II. p. 41,—2.

† Vide SAUVAGES. *Nesolog. Method. Clafs. X. Ord. VI.* sub init.

## DEFINITIO.

X.—I. *Icterus* a CULLENO satis forsitan accuratè sic definitur: “*Flavedo cutis et oculorum; fæces albidæ; urina obscure rubra, immissa colore luteo tingens.* \*”

2. Hæc (X. I.) definitio ad *flavum* tantummodo *icterum* pertinet. CULLENO enim, ut ipse fatetur †, dubium visum est, utrùm cæteræ species a SAUVAGESIO ‡ aliisque *nosologis* memoratæ, rectè, necne, *icteri* appellentur.

SIG-

\* Vide CULLEN. *Synops. Nosolog. Method.* Tom. II. Gen. XCI.

† Vide CULLEN. *Synops. Nosolog. Method.* ibidem.

‡ Vide SAUVAG. *Nosolog. Method.* Class. X. Ord. VI.



## SIGNA.

XI. *Aurigo* nonnunquam subitò, nullo edito signo, quo ejus impetum exploret medicus, invadit. Plerumque autem, eam in propinquo esse, prænunciant sensus ponderis, et in hypochondriorum dextro dolor, qui modò acutus est, modò obtusus; simulque ventriculi inflatio, flatus, aliaque signa, quæ pravam alimentorum concoctionem comitari solent.

XII. Eodem ferè tempore, lassescit homo, iners fit, ignavus et somniculosus; atque tantum ei motûs est tædium, ut ægerrimè, nisi quò aut sollicitantem appetitum expleat, aut urgenti pareat necessitati, in motum etiam levissimum cieatur.

B

XIII. Haud

XIII. Haud multò pòst, quod in oculis album esse debet, fit luteum \*. Tum flavescunt deinceps tempora, collum et totum corpus, imò ipsæ carnes, ossa †, ungues, cartilaginee et cerebrum ‡.

XIV. Urina interim crocea fit, et immissa lintea luteo colore tingit : fæces albidæ fiunt aut cineræ, et argillam figularem soliditate et tenacitate referunt : saliva, quæ in sano homine saporis expers est, aliquando amarescit, et cibo, dum dentibus manditur, extenuatur, molitur, suam impertit amaritiam. Imò ipse sanguis, e vena missus, nonnunquam luteus apparuisse fertur. Lacti autem, ut testatur HEBERDENUS,

per

\* Vide AUREL. CORNEL. CELS. *De Medicin.* Lib. III. cap. XXIV.

† Vide SAUVAGES. *Nosolog. Method.* Tom. II, p. 585.

‡ Vide SANDERIS. *Treatise on the Structure, Economy, and Diseases of the Liver*, edit. LOND. ann. M,DCC,XCIII, p. 175.

per totum morbum, suus constat color : quocirca, non mirari non possumus maternam quasi curam, qua alma natura infantum nutritui providit.

XV. Eodem tempore, ictericus sitit admodum ; cibum fastidit, nauseat, aliquando etiam, protinus ut assumitur aliquid, vomit. Ei simul inflatur ventriculus ; intestina gravi strepitu murmurant ; atque alvus pigra modò est, modò perquam astricta.

XVI. Solentque accedere et dolor capitis, et frequens singultus, et præcordiorum dextrâ parte durities ; et, ubi corporis vehemens motus est, spirandi difficultas, inembrorumque resolutio \*.

XVII. Crescentibus in dies lassitudine et

B 2

pigritiâ,

\* Vide AUR. CORN. CELS. *De Medicin.* Lib. III. cap.

pigritiâ, omnia, quæ inspiciuntur, flavida appa-  
 rere \* dicuntur ; verùm, nihil tãle accidere, nunc  
 omnes inter medicos convenit. Quinetiam, ubi-  
 que arescit et prurit cutis †. Denique, ubi  
 diutius manet morbus, totum corpus cum pallo-  
 re quodam inalbescit ‡ : aut lenta et insanabilis  
 supervenit febris, quæ ægrum, dolore et debili-  
 tate confectum, e vita tollit ; testantibus enim  
 HIPPOCRATE et DIOCLE, si, post febrem, ori-  
 tur morbus regius, etiam prodest, sin, post  
 morbum regium, febris, occidit § ; quod idem,  
 ni fallimur, experientia peritissimi cujusque me-  
 dici etiamnum testatur.

## CAUSÆ

\* Vide FREDERIC. HOFMAN. *Oper.* Tom. III. cap. XII.

† Vide SAUVAG. *Nosolog. Method.* Tom. II. p. 585.

‡ Vide AUREL. CORN. CELS. *De Medicin.* Lib. III.  
 cap. XXIV.)

§ Vide AUREL. CORN. CELS. *De Medicin.* *ibid.*

## CAUSÆ REMOTÆ.

XVIII. CAUSARUM, unde *icterus* enascitur, duo sunt genera : quorum unum eas complectitur, quæ proclive ad morbum corpus faciunt ; alterum eas, quæ, proclivi facto corpori admotæ, morbum concitant: Quæ illo genere continentur, *PRÆDISPONENTES* ; quæ autem hoc, *EXCITANTES* appellantur.

## GENUS PRIMUM.

XIX. *INTESTINORUM TORPOR.*—Inter causas, quæ opportunum *ictero* corpus reddunt, imprimis memorandus torpor intestinorum est. Quibus enim pigratur alvus, in eorum summum intestinum bilis ex *ductu communi choledochi* jus-

to tardiùs et rariùs influit. Quocirca, dum in hoc ductu, vel in vesica fellis, diutius remoratur, partibus tenuioribus absorptis spissescit lentescitque ; neque profectò rarò, occasione sic datâ, concrecit in massulas, quales vel non omnino, vel saltem ægerrimè et cum gravi dolore, in summum intestinum transmittuntur.

XX. *TEMPERAMENTUM MELANCHOLICUM*.  
—Ob hanc (XIX.) fortasse causam, quibus est melancholicum corporis temperamentum, ii, præ cæteris, morbo regio inficiuntur. Hujusmodi enim hominibus plerumque est alvus plùs minùsve tarda, dura, et astricta.

XXI. *GRAVIDITAS*.—De eadem (XIX.) forsitan causâ, fœminæ, imprimis gravidæ, *aurigine* persæpe flavescunt. Non solùm enim præ graviditate, sed etiam sedentariâ et ignavâ, quam muliebriter agunt, vitâ, his alvus pigrior  
est,

est, quàm hominibus, quorum corpora plerumque magis exercentur.

XXII. *VITA SEDENTARIA.*—Hinc (XIX.) quoque apparet, quare sedentarii, velut sutores et sartores; atque homines in literas intenti, qui mentibus vegeti sunt, corporibus ignavi; præ iis, qui graviore labore vitam tolerant, *ic̄tero* decolorentur. Ob solitam enim corporis segnitiam, illiusmodi hominibus intestina plerumque torpent, seseque pigrè astringunt et relaxant; quam ob rem, bilis, ex *ductu communi choledochi*, non satis promptè in ea allicitur.

XXIII. His (XIX.—XXII.), de proclivitate ad *ic̄terum*, compressè memoratis, nunc animum in eas causas, quæ, proclivibus admotæ, morbum concitant, intendere opus est.

## GENUS SECUNDUM.

XXIV. *IMPEDITA BILIS SECRETIO.*—Omnes ferè vetusti auctores, et recentiorum quidem nonnulli, *icterum* impeditâ bilis secretionem effici opinati sunt. Quantum verò opinione laborentur, eò apparet; quòd hepar duritiis et abscessibus usque eò interdum afficitur, ut bilem vel non omnino, vel saltè perparcè, secernat, atque nihilo tamen magis supervenit *icterus*.

XXV. *BILIS LENTOR.*—Existimârunt nonnulli, bilis lentore et crassitudine morbum regium concitari.

XXVI. *Contra hanc verò (xxv.) opinionem* objici potest, talem lentorem, qualis bilem ineptam, quæ influeret in summum intestinum, redderet, multo sanè ineptiorem, quæ per



naliculos exiguissimos in sanguinem reflueret, redditurum.

2. Eandem, porrò, (xxv.) opinionem infirmat id, quod memoriæ traditur de ægroto quodam; qui, vivus, nulla *icteri* signa ostendit, sed, in cujus cadavere inciso, vesica fellis bile, præter solitum, spissâ, in immensum distenta conspiciebatur.\*

XXVII. *FLUXUS BILIS IN SUMMUM INTESTINUM IMPEDITUS.*—Causæ, quæ hunc morbum revera concitant, sunt eæ, quæcunque sint, quæ, ne in summum intestinum, ex ductu hepatico, ductive communi *cholecho*, influat bilis, impediunt.

XXVIII. Bilis, ne per ductum *cysticum* fluat, impedita, *icterum* concitare non potest. Hoc enim ductu impervio factò, ut bilis ex ductu hepatico in summum intestinum continuo rivo  
C
fluat,

\* Vide EDINBURG. *Med. Ess.* Vol. II.

fluat, necesse est: neque profectò bilis, quae, ullo tempore, in vesica fellis continetur, licet absorbeatur in sanguinem, ad *icterum*, nisi fugacissimum, efficiendum satis pollet.

XXXIX. *INFLAMMATIO.* ----- Ad hujusmodi (xxvii.) causas pertinet ductuum inflammatio. Ob hanc enim, illi aliquando omnino concresecunt, vel saltem usque eò coangustantur, ut bili transmissus non pateat.

XXX. Cùm ita (xxix) sit, minimè profectò negandum est, quin, licet hoc rariùs accidat, *icterus* acutam hepatis inflammationem nonnunquam comitari possit. Inflammatio enim, quam ceperit jecur, in ductum hepaticum, imò in *communem* forsitan *choledochum*, serpat; et sic impediatur, quò minùs bilis, ut naturaliter debet, in summum intestinum profluat. Meatu naturali intercluso, necesse est, ut retroagat cursum; et in circumfluum sanguinem

nem vel absorbeatur, vel, id profectò quod, SANDERISIO saltem iudice, fieri potest, per meatus felleos refluat.

XXXI. *SPASMUS*.----Cùm ductus, quibus fluit bilis, musculosâ tunicâ praediti sint, cuius fibrarum nonnullae in longum tendunt, aliae autem spirae modo, aut in orbem; dubitari vix potest, quin, orbiculatis fibris spasmò affectis, ita interdum constringantur ductus, ut bilem transmittere nequeant.

XXXII. *Auriginem* ex hac (xxxI.) causâ enasci, suspicandum est, quoties, nullo signo praemisso, inopinantem subitò invadit. Sic interdum afficiuntur viri demisso animo, foeminae *hystericae*, sed maximè pueri subito terrore impleti. Sed, ut *icterus* e spasmò inopinanter invadit, ita, soluto spasmò, festinanter decedit.

XXXIII. *MUCUS TENAX.*---Verisimile est, mucum tenacem, aliamve quamlibet glutinosam materiam, adèd nonnunquam meatus, quibus fluit bilis, oppilare, ut huic nullus, per illos, in summum intestinum introitus pateat.

XXXIV. Sic (xxxiii.) *icterus*, qui remediis opportunè assumptis facilè curatur, aliquando laxos, debiles, et pituitosos afficit; eos in primis, quibus pigra alvus est, et quorum ventriculus saepe inflatione afficitur, atque assumpta alimenta malè concoquit.

XXXV. Ob eandem (xxxiii.) causam, infantes recenter nati fugace *aurigine* haud rarò flavescent. In horum enim summo intestino, modo tardum *meconium* ductus *choledochi* osculum opplet, modo colostrum inibi coactum obturat; adèd, ut bilis ex ductu in summum intes-

intestinum fluxus, ex toto, impediatur.\* Haec autem *aurigo* facilè curabilis est, quippe cùm, expurgatis intestinis, brevi evanescat.

XXXVI. *CONCRETA*.---Omnes ferè humores, qui a sanguine secernuntur, remorâ haud rarò in massulas coeunt: quocirca, in variis corporis partibus, potissimùm autem visceribus, concreta ab incidentibus rimantibusque *anatomicis* nonnunquam eruuntur. Haec autem, alia ab aliis, differunt colore et gravitate, aliisque qualitatibus, pro liquore quo concrescunt; neque, profectò, rarò etiam ea, quae in eodem liquore, bile velut, formantur, hominibus temporibusve diversis, discrepant inter se.

XXXVII. Bilis verò, prae caeteris humoribus a sanguine secretis, apta, quae in ejusmodi

\* Vid. SAUVAGES. *Nosolog. Method.* Tom. II. p. 590.

SWIETEN. *Comment. in BOERHAV. Aphor.* 950.

Tom. III. pag. 128.

modi (XXXVI.) concreta durescat, videtur.

Talia enim concreta in vesica fellis, imò in ductibus, *cystico* nempe et *choleodocho*, per quos ex hac in summum intestinum fluit bilis, haud rarò, incisis cadaveribus, conspiciuntur.

XXXVIII.---I. Concreta (XXXVII.) fellea multum, aliud ab alio, magnitudine differunt. In ductibus aliquanto exiguiora sunt; in vesica fellis in magnam molem augescunt, diuque interdum, sine gravi hinc detrimento, aut dolore capto, morantur.

2. Multum itidem variant figurâ. Ut plurimum multangula sunt: interdum verò triangula: interdum *prismam* figurâ referunt.\*

3. Quin-

\* Vid. EDINBURG. *Med. Ess.* Edit. v. Vol. II. Art.

3. Quinetiam, discoloria sunt. Albida enim haec sunt; illa flavida: alia subfusca; subnigra alia: alia, denique, nigritie saturata.†

4. Constant, quantum ex periculis, quae perdoctè cepit SANDERISIUS, accipimus, ex resinoso quodam; terrâ, ut videtur, calcariâ; alcalibusque duobus, *soda* nempe et *ammonia*.‡

5. Diversa concreta fellea inter se comparata, gravitate, aliud ab alio, differunt: omnia tamen aquae dulci, in quam induntur, vel facilè supernatant, vel in ea aegrè subsidunt.§

6. Flammam, ob resinosi aliquid, quod iis, inest

† SANDERIS. Opusc. supra citat. p. 113.

‡ Ibid.

§ Vid. EDINBURG. *Med. Ess.* Vol. II. Art. XXVIII.

inest, concipiunt; et flammata protinus deinde  
ignescunt.

7. Quod ad fabricam attinet, ex laminis plu-  
rimis constant: quae, interiora versus, e cen-  
tro, radiorum more, divaricant; exteriora autem  
versus, commune centrum circumeunt.

8. Gustatu amara sunt: tactu levia; et,  
tanquam illita oleo, lubrica.\*

XXXIX. Hujusmodi (xxxviii.) concreta, e  
jecore in ductum hepaticum, et adhuc magis  
e vesica fellis in ductum *choledochum*, pro-  
pria gravitate delapsa, aut valido quolibet  
motu, potissimum vomitu, extrusa, si in al-  
terutro morantur, non solum, meatu praecluso,  
bilis in summum intestinum fluxui officiant, sed  
etiam gravissimum et ferme impatibilem con-  
citant dolorem.

CAUSA

D

XL,

\* Vid. EDINBURG. *Med. Ess.* Vol. II. Art. xxviii.



XL. *Icterus* a concretis ductum obturanti-  
 bus incepisse, satis ferè constabit, si motum  
 quemlibet nitivne validum, imprimis autem  
 vomitum utut concitatum, subsecutus fuerit ; si  
 ab initio perquam acutus fuerit dolor ; et si,  
 haud longo pòst tempore, dolore subitò ces-  
 sante, subsequatur biliosa diarrhoea, et in iis,  
 quæ infrà eruperint, concretum conspiciatur.

XLI. *TUMORES*,---qualescunque sint, sive  
 in ipsorum ductuum tunicis, sive in hepate \*  
 vicinisve partibus, dummodo aut ductum he-  
 paticum aut communem valdè comprimant,  
 bilis in summum intestinum fluxui officiant,  
 usque eò, ut *icterus* subsequatur.

XLII. His (xviii.---xli.) dictis, de causis,  
 uti vocantur, remotioribus, nunc opus est, ut  
 de causa *proxima* astrictè disseramus.

IX

D

CAUSA

\* Vid. *Edinburg. Med. Ess.* Vol. II. Art. xxiv.

## CAUSA PROXIMA.

XLIII. CAUSA, quae praesens *icterum* facit, minuta levat, sublata tollit, bilis e sanguine, ministro hepate, secreta, et ex ductibus, hepatico nempe *choledochove*, in eundem reiecta, videtur.

XLIV. I. Duabus forsans viis revehitur in sanguinem bilis. Vel enim, ut MONRO, ex ingenio clarissimus, experimentis luculenter demonstravit, a vasis bibulis, quae in ductus patentibus osculis inhiant, absorbetur; et absorpta, receptaculi *chyli* ductûsque *thoracici* interventu, in irrequietum sanguinem defertur:

2. Vel ex ductibus, per *poros biliferos*, in surculos venae portae refluit; unde, intermediis

mediis venis cavis hepaticis et cavâ magnâ inferiore, in dextram devehitur cordis auriculam, et sic totum sanguinem inquinat.

XLV. Illâ (XLIV. 1.) enimvero viâ, ex obturatis praeclusisve ductibus, in sanguinem reduci bilem, inter omnes convenit medicos; et experimenta, quae accuratè instituit, et publici juris nuper fecit SANDERISIUS, nullam apud quosdam reliquerunt dubitationem, quin isthinc hac (XLIV. 2.) itidem viâ in sanguinem, a quo non pridem secreta est, redux fluat.\*

XLVI. Cùm signa *icteri* vel ex bilis defectu in alvo pendeant, vel ex eadem sanguinem inquinante, a re nostra haud alienum erit, hîc loci, memorare, ex quibus partibus constituatur bilis, et cui usui interserviat.

D 2

XLVII.

\* Vid. SANDERIS. Opuscul. sup. citat.

XLVII. Bilis, quatenus experimenta ejus partes patefecerint, constat ex latice aquoso, unde permanat odor pungens; et ex materia mucosa, quæ Hovi albumen simulat; et ex resinosi quodam, unde pendent color et amaritudo; denique *sodae carbonate*. †

XLVIII. Quod ad usus bilis attinet, intelligendum est, intestina in motus salutare instigare; aquosas salinasque alimentorum partes cum oleosis uniter commiscere, ut ex omnium unitate nutritius *chylus* paretur; coactas partes attenuare et solvere, quò vasis bibulis inhiantibus faciliùs exsorbeantur; et, denique, fermentationi et putredini adversari.\*

XLIX. His (XLVII. et XLVIII.) cognitis, minimè mirandum est, si, ductibus, quibus debet

† Vid. SANDERIS. Opuscul. sup. citat.

\* Vid. SANDERIS. Opuscul. sup. citat.



## RATIO QUORUNDAM SIGNORUM.

L. *FLAVUS* (XIII.) *COLOR*---suffusione bilis ex circumfluo sanguine efficitur. Maximè autem conspicuus est in tunica oculorum *albuginea*, utpote quae naturaliter alba sit.

LI. *URINA CROCEA*, et *SALIV<sup>A</sup>* (XIV.) *AMARA*, ---est, ob bilem ex inquinato sanguine secretam, et illi colorem, huic amaritudinem, impertientem.

LII. *FAECES* (XIV.) *ALBIDAE*---sunt, quòd, propter bilem, ne in summum intestinum influat, impeditam, non ex eâ flavum, ut solebant, colorem accipiunt.

LIII. *ASTRICTA* (XV.) *ALVUS*---est, quòd, ductu communi *choleodocho*, ductuve hepatico  
fic

sic praecluso, ut in summum intestinum bilis nequeat influere, intestina in motus salutare, quibus infrà transmittantur fæces, non, ut debent, cientur.

LIV. *INFLATIO VENTRICULI, NAUSEA*, et (XV.) *VOMITUS*,---partim ventriculi infirmitate efficiuntur; ob mirum enim consortium, quod ventriculo est cum intestinis, si haec torpeant, ille quoque torpet, et ad alimenti concoctionem fit invalidus: partim moventur proprio ventriculi succo, quem bilis, unà cum eo ex sanguine sive secreta sive effusa, multùm inquinavit.

LV. *INERS, IGNAVUS*, et (XII.) *SOMNULOSUS*,---ictericus est, quòd, propter miram omnium corporis partium consortionem et quasi communitatem, intestinis torpentibus, caeterae simul partes itidem torpent.

LVI.

LVI *PRÆCORDIORUM DEXTRA PARTE* (XVI.)

*DURITIES*,--efficitur vel vesicâ felleâ nimis bile distentâ ; vel hepate ipso bile, *poris biliferis* cumulatâ, admodum tumefacto ; vel utrisque simul.

LVII. *CUTIS* (XVII.) *PRURITUM*... movet

bilis, ex arteriis exhalantibus effusa, qua nervi, quibus ad sentiendum instruitur cutis, irritantur.

LVIII. *FEBRIS* (XVII.)--oritur ex irritatione, quam efficiunt vel concreta fellea ductibus hærentia, vel bilis, qua inquinatur circumfluvus sanguis.

LIX. His (I.---LVIII.) signis explicatis, proximum est, ut, quæ signa mala sint, quæ bona, quàm paucissimis dicamus.

PROG.



IV. PROGNOSIS.

LX. BONUM hujus morbi praecinendum est eventum, vel augurandum malum, pro causis, quae concitaverint, etiamnumque perpetuent; pro signis, quibus notetur; et pro icterici aetate.

LXI.---1. Si ab organorum vitiis non progeneratus fuerit, veluti tumoribus aut ductuum ipsorum, aut hepatis, aut aliarum partium vicinarum; sed a spasms ductus constringentibus, aut muco tenace concretisve felleis non ita magnis eosdem opplentibus obsignantibusve; bonum est.

2. Ubi aliquid bilis supra infra ve erumpit; ubi cutis neque multum flavescit, neque nigricat; ubi alimenta satis concoqui videntur, neque ex chyli defectu macrescit corpus; bonum est iterum.

3. Denique, bonum est, cùm ictericus juvenilem agit aetatem; nequedum vel morbo ipso, vel aliis morbis antecedentibus, inagnopere infirmatus est.

LXII.---I. Contra, si vel vitia ductuum ipsorum, vel duritiae hepatis, vel etiam magna concreta ductus oppilantia, *icterum* effecerint, periculosum est.

2. Malum est, cùm cutis nigrescit; cùm alvus perquam sicca est et astricta, et in iis, quae aegrè dejiciuntur, nullum bilis indicium est; et cùm alimenta tardè et non penitùs concoquuntur, atque morbus jam frequenter

Rediit.

3. Pejus verò est, ubi hepar induruit; ubi abdomen tumidum est, et durum.

4. Pessimum est, si ictericus foedissimo  
alvi

alvi profluvio quasi colliquescit ; si vel cava corporis, vel tela adipalis, vel omnia haec simul, aquâ effusâ inundantur ; si spiritus difficilis est ; si cor palpitât, et arteriae inaequaliter ordinantur. In eodem morbo mortifera quoque sunt febris *hectica*, sitis inexplebilis, et anxietas ; quippe cùm spes ictericum ad sanitatem perducendi omnino tollant.

5. Servari non potest ictericus, si senio confectus sit, ejusve vires morbis aliis praegressis jam multùm fractae fuerint.

RATIO

## RATIO MEDENDI.

LXIII. ICTERUS, si duritiis hepatis, aut ductuum concrecioni supervenerit, vix, et plerumque ne vix quidem, sanabilis est. Nulla enim medicamenta novimus, quibus aut illæ certò emolliantur, aut hi reddantur bili pervii.

LXIV. Cùm ita (LXIII.) sit, medendi ratio, quam secuturi sumus, ad *icterum* potissimùm respicit, qui vel ex spasmo ductuum oritur, vel ex concretis felleis eosdem obturantibus.

LXV. Quò hujusmodi *icterus* curetur, opus est, primùm spasmum solvere; deinde concreta, si qua ductibus inhaerere credamus, expellere.

## CONSILIUM PRIMUM.

LXVI. SPASMUS ductuum solvendus est sanguinem mittendo; deinde fovendo; et tum opio et diluentibus.

LXVII. SANGUINIS DETRACTIO. Si ictericus juvenis sit; et ictus arteriarum febrem et inflammationem indicent, aut saltem injiciant metum, ne hae superveniant; sanguis e brachio mittendus est. Hoc enim non solum, contra febrem ardentem et inflammationem, pollet, sed etiam efficit, ut spasmus facilius solvatur.

LXVIII. FORTUS. Ictericis multum prodest, abdomen externum aqua tepida, vel la-  
neis ex aqua tepida expressis, internum aqua tepida, per anum, clysteris ope immissa, subinde fovere. Hoc enim facto, spasmus haud ra-

rò solvitur, et, bile in summum intestinum  
intromissâ, morbus evanescit.

CONSILIUM SECUNDUM

LXIX. *OPIUM*. --- Sanguine, si opus fuerit,  
elicitò, et sic inflammatione vel repressâ vel  
praecautâ, icterico efficax saepe et præsentaneum  
auxilium affert opium.

LXX. *LIGUORES MITES*, --- ex iis quae di-  
luunt et emolliunt, interea assumendi sunt.

CONSI-

LXXIII. *Purgatio*... in eundem (LXXI).  
finem, multum ad concreta eliminanda pro-  
ficat, alvum purgat. Alvo enim cathartico  
stimulatâ, quasi emulgetur pars ductus interi-  
præclusionem et summum intestinum; quam  
ob rem, bilis, ultra præclusionem cumulatâ,  
officiis

in solvitur, et bile in summum intestinum  
introumissa, morbis evanescit.

## CONSILIUM SECUNDUM.

LXXI. Opus sanguine, si opus fuerit.

LXXI. Ad expellenda concreta, nihil  
tantùm prodest, quantùm lenis corporis agi-  
tatio.

LXXII. *VOMITIO.* Hoc (LXXI.) consilio,  
vomitus movendus est, et, ut nonnulli suadent,  
gravis. Sed, MONRONE iudice, lenis debet  
esse; idcirco quòd periculum est, ne, graviori-  
bus vomendi nixibus, ductus præclusus et  
admodum distentus dirumpatur.

LXXIII. *PURGATIO.*—In eundem (LXXI.)  
finem, multùm ad concreta eliminanda pro-  
ficit, alvum purgare. Alvo enim catharticis  
stimulatâ, quasi emulgetur pars ductûs inter  
præclusionem et summum intestinum; quam  
ob rem, bilis, ultra præclusionem cumulata,  
officiens

officiens concretum aut mucum enixiùs protrudit.

LXXIV. Cathartica autem lenia debent esse, quippe quæ, dum intestina incitant, ductumque *choledochum* sollicitant, corpus refrigerent, et sic obstant, ne superveniat inflammatio.

LXXV. *EQUITATIO*,---denique, corpus agitando multùm pollet, ad expellenda ea, quæ ductus præcludunt. Ictérico igitur, si dolorem non multùm augeant equi motus, identidem equitandum est.

FINIS.